

# บทความพิเศษ

## Modified WOMAC Scale for Knee Pain.

เสก อักชราณุเคราะห์, พ.บ.

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

WOMAC (the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินผู้ป่วยภาวะ osteoarthritis ของข้อเข่าและสะโพก เริ่มใช้ในปี 1986 โดย Bellamy N, Buchanan WW<sup>(1,2,3)</sup> ประกอบด้วย 5 dimensions และ 41 items โดยให้คะแนนแต่ละ item ดังนี้ 0=none 1=slight 2=moderate 3=very 4=extreme importance ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 WOMAC Scale โดย Bellamy N, Buchanan WW.

- 9 Putting on socks
- 10 Rising from bed
- 11 Taking off socks
- 12 Lying in bed
- 13 Getting in/out bath
- 14 Sitting
- 15 Getting on/off toilet
- 16 Heavy domestic duties
- 17 Light domestic duties

### Paint

- 1 Walking
- 2 Stair climbing
- 3 Nocturnal
- 4 Rest
- 5 Weight bearing

### Social Function

- 1 Leisure activities
- 2 Community events
- 3 Church attendance
- 4 With spouse
- 5 With family
- 6 With friends
- 7 With others

### Stiffness

- 1 Morning stiffness
- 2 Stiffness occurring later in the day

### Emotional Function

- 1 Anxiety
- 2 Irritability
- 3 Frustration
- 4 Depression
- 5 Relaxation
- 6 Insomnia
- 7 Boredom
- 8 Loneliness
- 9 Stress
- 10 Wellbeing

### Physical Function

- 1 Descending stairs
- 2 Ascending stairs
- 3 Rising from sitting
- 4 Standing
- 5 Bending to floor
- 6 Walking on flat
- 7 Getting in/out car
- 8 Going shopping

เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในประเทศไทย จึงได้ดัดแปลงเป็น Modified WOMAC Scale ดังตารางที่ 2 โดยมุ่งหวังจะให้ใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรค (severity) และ ใช้ในการติดตาม (follow up) หลังการรักษา

### ตารางที่ 2 Modified WOMAC Scale

โดย เสก อักษรานุเคราะห์

#### SECTION A

How much pain do you have ?

1. เดินบนพื้นราบ score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No pain	= 0
เดินแล้วเจ็บแต่ไม่เขยก	= 1 - 2
เดินแล้วเจ็บและเขยก	= 3 - 5
เดินแล้วเจ็บและเขยกและใช้ brace	= 6 - 7
เดินแล้วเจ็บและเขยกและใช้ brace และใช้ gait aid	= 8 - 9
เดินไม่ได้	= 10

2. เดินขึ้นลงบันได score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No pain	= 0
Pain เดินขึ้นหรือลง	= 1 - 2
Pain ทั้งขึ้นและลง	= 3 - 5
ใช้ support เดินขึ้นหรือลง	= 6 - 7
ใช้ support ทั้งขึ้นและลง	= 8 - 9
ขึ้นลงบันไดไม่ได	= 10

3. ขณะนอนบนเตียงในตอนกลางคืน score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No Pain	= 0
Pain ขณะ flexion หรือ extension	= 1 - 2
Pain ทั้ง flexion และ extension	= 3 - 5
Pain ขณะพลิกตัวข้างใดข้างหนึ่ง	= 6 - 7
Pain ขณะพลิกตัวทั้งสองข้าง	= 8 - 9
Pain ขณะนอนเฉยๆ	= 10

4. ขณะลุกนั่ง score \_\_\_\_\_ (0- 10)

No pain	= 0
Pain ขณะลงนั่ง	= 1 - 2
Pain ขณะลุกขึ้น	= 3 - 5

Pain ขณะลงนั่งและลุกขึ้น = 6 - 7

ต้องใช้ support ช่วย = 8 - 9

ไม่สามารถลงนั่งและลุกขึ้นเองได้เลย = 10

5. ขณะยืนลงน้ำหนัก score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No pain = 0

Pain ขณะยืนลงน้ำหนัก 2 ขา

แต่พอทันได้ตลอด = 1 - 2

Pain ขณะยืนลงน้ำหนัก 2 ขา

แต่ทันได้ช้าครู่ = 3 - 5

Pain ทั้งที่ ต้อง partial W/B

without support = 6 - 7

Pain ทั้งที่ ต้อง partial W/B

with support = 8 - 9

ยืนลงน้ำหนักไม่ได้ = 10

#### SECTION B

Stiffness ?

6. เมื่อตื่นนอนตอนเช้า score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No stiffness = 0

Stiffness ขณะ full flexion

or extension = 1 - 2

Stiffness ทั้ง full flexion

and extension = 3 - 5

Stiffness < 50 % ROM = 6 - 7

Stiffness > 50% ROM = 8 - 9

Extreme stiffness = 10

7. ขณะเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างวัน

(sitting,lying,resting) score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No stiffness = 0

Stiffness ขณะ full flexion or

full extension = 1 - 2

Stiffness ทั้ง full flexion

and full extension = 3 - 5

Stiffness <50% ROM = 6 - 7

Stiffness >50% ROM = 8 - 9

Extreme stiffness = 10

**SECTION C**

What degree of difficult do you have ?

8. เดินลงบันได score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
เดินลงอย่างปกติแต่ข้ากกว่าธรรมชาติ	= 1 - 2
เดินลงทีละขั้น	= 3 - 5
เดินลงทีละขั้นแต่ต้องใช้ support	= 6 - 7
เดินลงทีละขั้นใช้ support และมีเครื่องช่วยพยุง	= 8 - 9
Extreme difficulty	= 10

9. เดินขึ้นบันได score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
เดินขึ้นอย่างปกติแต่ข้ากกว่าธรรมชาติ	= 1 - 2
เดินขึ้นทีละขั้น	= 3 - 5
เดินขึ้นทีละขั้นแต่ต้องใช้ support	= 6 - 7
เดินขึ้นทีละขั้นใช้ support และมีเครื่องช่วยพยุง	= 8 - 9
Extreme difficulty	= 10

10. ลุกยืนจากท่านั่ง score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ลุกปกติด้วยขาข้างเดียวที่เจ็บแต่ซ้ำ	= 1 - 2
ต้องอาศัยขาอีกข้างช่วยยัน	= 3 - 5
ต้องใช้แขนช่วยยัน	= 6 - 7
ต้องมีคนช่วยดูด	= 8 - 9
ลุกไม่ได้เลย	= 10

11. ขันยืน score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ยืนลงน้ำหนักด้วยขาข้างเดียว	= 1 - 2
ได้แต่เจ็บ	= 3 - 5
ต้องยืนลงน้ำหนัก 2 ขาร่วมกัน	= 6 - 7
ต้องใช้ knee support	= 8 - 9
ต้องใช้ gait aid	= 10

12. ก้มตัว score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ก้มตัวเข้าตรงแต่ไม่สุด	= 1 - 2
ก้มตัวได้สุดแต่ต้องออกเข้า	= 3 - 5

ต้องออกเข้าแต่ก้มได้ไม่สุด	= 6 - 7
เวลา ก้มต้องออกเข้าและต้องเกะะ	= 8 - 9
ก้มไม่ได้เลย	= 10

13. เดินบนพื้นราบ score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
เดินก้าวปกติแต่เจ็บเข่า	= 1 - 2
เดินต้องเบยก	= 3 - 5
เดินด้วย cane	= 6 - 7
เดินด้วย crutch or walker	= 8 - 9
เดินไม่ได้เลย	= 10

14. ขึ้น-ลงรถ score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ขึ้นลงปกติแต่เจ็บข้อเข่า	= 1 - 2
ต้องใช้หมุนตัวเข้าออก	= 3 - 5
ต้องเกะะหรือโหนตัว	= 6 - 7
ต้องมีคนพยุงเข้าออก	= 8 - 9
เข้าออกไม่ได้เลย	= 10

15. ไป shopping score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ต้องพักเป็นระยะ	= 1 - 2
ต้องใช้ cane	= 3 - 5
ต้องใช้ crutch or walker	= 6 - 7
ต้องนั่ง W/C	= 8 - 9
ปีบไม่ได้เลย	= 10

16. ใส่ถุงเท้าหรือสวมถุงน่อง score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ยืนใส่ได้แต่เจ็บ ทำด้วยความลำบาก	= 1 - 2
ต้องนั่งใส่	= 3 - 5
นั่งใส่ด้วยความลำบาก	= 6 - 7
นั่งใส่แต่ต้องมีคนช่วย	= 8 - 9
ต้องนอนให้คนช่วยใส่	= 10

17. ลุกจากเตียง score \_\_\_\_\_ (0 - 10)

No difficulty	= 0
ลุกขึ้นแล้วเข้าเหยียดได้แต่ตึงเจ็บ	= 1 - 2
ลุกขึ้นแล้วเหยียดเข้าไม่ได้	= 3 - 5
ลุกในขณะเข้าห้องน้ำที่ขอบเตียง ก่อนยืน	= 6 - 7

ลูกจากเดียงในห่านอนกว่า	= 8 - 9	ลูกขึ้นลงไม่ได้	= 10
ลูกไม่ได้เลย	= 10	23. งานบ้านหนัก score _____ (0 - 10)	
18. ถอดถุงเท้าหรือถุงน่อง score _____ (0 - 10)		No difficulty	= 0
No difficulty	= 0	ยืนทำงานได้	= 1 - 2
ยืนถอดได้แต่เจ็บด้วยความลำบาก	= 1 - 2	ยืนทำงานต้องใช้ support	= 3 - 5
ต้องนั่งถอด	= 3 - 5	ต้องนั่งทำงาน	= 6 - 7
นั่งถอดด้วยความลำบาก	= 6 - 7	นั่งทำงานได้เฉพาะอย่าง	= 8 - 9
นั่งถอดแต่ต้องมีคนช่วย	= 8 - 9	ทำงานหนักไม่ได้เลย	= 10
ต้องนอนให้คนช่วยถอด	= 10	24. งานบ้านเบาๆ score _____ (0 - 10)	
19. นอนบนเตียง score _____ (0 - 10)		No difficulty	= 0
No difficulty	= 0	ยืนทำงานได้	= 1 - 2
นอนหงายเหยียดเข่าได้ตรง	= 1 - 2	ยืนทำงานต้องใช้ knee support	= 3 - 5
ต้องนอนตะแคงงอเข่า	= 3 - 5	ต้องนั่งทำงาน	= 6 - 7
นอนตะแคงทันเข่าที่ปวดไม่ได้	= 6 - 7	นั่งทำงานได้เฉพาะอย่าง	= 8 - 9
พลิกตัวแล้วปวด	= 8 - 9	ทำงานหนักไม่ได้เลย	= 10
นอนไม่ได้เลย	= 10		
20. ลุกเข้า-ออกเตียง score _____ (0 - 10)		เอกสารอ้างอิง	
No difficulty	= 0	1. Bellamy N, Buchanan WW: Outcome measurement in osteoarthritis clinical trials : The case for standardization. Clin Rheum 1984; 3:293-305.	
ทิ้งตัวหรือลูกขึ้นช้าๆ	= 1 - 2	2. Bellamy N, Buchanan WW: A preliminary evaluation of the dimensionality and clinical importance of pain and disability in osteoarthritis of the hip and knee. Clin Rheum 1986; 5:231-41.	
ยังลูกขึ้นลงด้วยขาข้างเดียวได้	= 3 - 5	3. Bellamy N, Buchanan WW: A health status instrument for osteoarthritis of hip and knee: Stage 2 analysis of a self-administered questionnaire (abstr). In : Abstracts : Australian Rheumatism Association Annual Scientific Meeting, 1987:32.	
ลูกขึ้นลูกลงต้องใช้ support	= 6 - 7		
ลูกขึ้นลูกลงต้องมีคนช่วย	= 8 - 9		
ลูกขึ้นลงไม่ได้	= 10		
21. นั่ง score _____ (0 - 10)			
No difficulty	= 0		
นั่งปกติได้แต่ต้องขยับขาตลอดเวลา	= 1 - 2		
นั่งต้องเหยียดขาหรือองศาข้างที่ปวด	= 3 - 5		
ขณะนั่งต้องใช้ knee support	= 6 - 7		
ขณะนั่งต้องใช้ knee support และที่รองข้อเข่า	= 8 - 9		
นั่งไม่ได้เลย	= 10		
22. ลุกเข้าออกจากการล้ม score _____ (0 - 10)			
No difficulty	= 0		
ทิ้งตัวหรือลูกขึ้นช้าๆ	= 1 - 2		
ลูกขึ้นลูกลงด้วยขาข้างเดียว	= 3 - 5		
ลูกขึ้นลูกลงด้วย support	= 6 - 7		
ลูกขึ้นลูกลงต้องมีคนช่วย	= 8 - 9		